CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRIPE Y COVID EN POBLACIÓN INFANTIL 2026-2027

¿Por qué es aconsejable la vacunación?

Los/as menores de 5 años presentan altas tasas de infección y transmisión comunitaria

Padecer una enfermedad crónica supone un mayor riesgo de desarrollar complicaciones

POBLACIÓN DIANA

Niños/as de 6 a 95 meses (hasta que cumplan 8 años)

Cuidador/a de lactantes < 6 meses (salvo si la madre fue vacunada en el embarazo)

Niños/as ≥ 8 años con enfermedad crónica (FR)

Personas de 8-18 años en tratamiento prolongado con AAS (riesgo Sd. Reye tras gripe)



Niños/as < 18 meses: vasto externo. Agujas 0,6 o 0,5 x 25 mm



Niños/as > 18 meses: deltoides. Aguja 0,6 o 0,5 x 25mm o 16mm

¿Qué vacunas administramos?

FLUENZ

Trivalente, atenuada

Vía intranasal: 0,1 ml en cada fosa nasal

Destinada a niños/as de 2 a 8 años

- hasta que cumplan 8 -

Puede coadministrarse con vacunas vivas atenuadas (TV o Varicela)

CAUTION

EVITAR contacto estrecho 1-2 semanas con personas con inmunosupresión grave

NO INYECTAR, NO MENORES DE 24 MESES

STOP

Inmunosupresión o asma grave (sibilancias activas), tratamiento con ácido acetilsalicílico, antecedentes de Guillain-Barré

IMPORTANTE

La vacuna se puede administrar con infección respiratoria leve

En caso de congestión nasal importante, esperar o utilizar otra vacuna

INFLUVAC

Trivalente inactivada y cultivada en huevo

Administrada vía IM o SC profunda

¡Administrar la dosis **ENTERA**!

UTILIZAR EN:

Niños/as de 6 a 23 meses

Niños/as de ≥ 8 años con FR

¡Escanéame para ir a ficha técnica!



¡Recuerda! Se recomienda respirar con normalidad durante la administración

COMIRNATY

En centro de salud: **población ≥ 12 años**

1 dosis si F. Riesgo

2 dosis si inmunosupresión grave

3 meses desde infección o última dosis COVID

¿CUÁNTAS DOSIS?

UNA DOSIS si no presenta ningún factor de riesgo

UNA DOSIS si tiene FR y es ≥ 9 años

DOS DOSIS separadas 4 semanas si se cumplen 3 condiciones:

1. Presenta un factor de riesgo
2. Es el 1º año que se vacuna
3. Edad entre 6 meses y 8 años incluidos

De la vacuna que le corresponda por edad, INFLUVAC o FLUENZ

¿DUDAS?

Se pueden administrar estas vacunas durante una infección leve y coadministrar con el resto de vacunas de calendario

FLUCELVAX

SOLO alérgicos a aminoglucósidos

***Circuito especial**

¡Registra antes de vacunar, por seguridad!

Si te gusta, ¡comparte!

@semap_

@_semap_

Semap Sociedad Científica

SEMAP

SOCIEDAD MADRILEÑA DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA